

Investigating Physiological and Perceptual Indicators of Cold Stress among Stone-Cutting Workers in Isfahan City, Iran

Saeid Sabzehali¹, Ehsanollah Habibi², Habibolah Dehghan³, Awat Feizi⁴, Hossein Sabzehali¹

Original Article

Abstract

Background: Cold exposure, especially during the winter months, presents significant hazards for workers, resulting in decreased performance, increased productivity loss, and a higher risk of occupational accidents. This study aims to assess the extent of cold stress among stone-cutting workers in Isfahan City, Iran.

Methods: Thirty workers with no prior history of illness were randomly selected for the study, and thermal conditions of their work environment were assessed by measuring indicators of thermal strain, including core and surface body temperatures, heart rate, systolic and diastolic blood pressure, and physiological responses before the commencement of work and two hours thereafter. Data analysis was performed using SPSS software.

Findings: The average wind chill index was 323.63 kcal/m²/h, the wind chill equivalent temperature was 20.3 °C, the minimum required clothing insulation was 0.93 clo, and the cold strain index was 2.15. Based on the results of the cold stress indices, it can be said that the workers were not significantly exposed to cold stress.

Conclusion: The findings suggest that at temperatures above 10 °C, with a wind chill index below 400 kcal/m²/h, the possibility of workers being exposed to cold stress is significantly low. Furthermore, the minimum required clothing insulation index proves to be a more reliable metric for assessing cold stress levels in stone-cutting workers.

Keywords: Wind chill index; Weather conditions; Stone cutting

Citation: Sabzehali S, Habibi E, Dehghan H, Feizi A, Sabzehali H. Investigating Physiological and Perceptual Indicators of Cold Stress among Stone-Cutting Workers in Isfahan City, Iran. J Health Syst Res 2026; 22(2): 357-63.

1- MSc Student, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Professor, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Associate Professor, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Saeid Sabzehali; MSc Student, Department of Occupational Health and Safety Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran; Email: zsabzehalisaeid@yahoo.com

ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و ادراکی شرایط جوی کارگران سنگبری‌های شهرستان اصفهان

سعید سبزه‌علی^۱، احسان‌اله حبیبی^۲، حبیب‌اله دهقان^۳، آوات فیضی^۴، حسین سبزه‌علی^۱

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: مواجهه با سرما به خصوص در فصل زمستان، خطر بزرگی برای شاغلان محسوب می‌شود که کاهش عملکرد و بهروری و افزایش وقوع حوادث شغلی، از جمله عوارض این عامل زیان‌آور محسوب می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی وضعیت تنش سرمایی در کارگران سنگبری‌های شهرستان اصفهان بود.

روش‌ها: پس از انتخاب تصادفی ۳۰ نفر از کارگران با شرط نداشتن سابقه بیماری، وضعیت حرارتی محیط، شاخص‌های استرین حرارتی شامل دمای عمقی و سطحی بدن، ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و پاسخ‌های فیزیولوژیکی آنان قبل از شروع به کار و دو ساعت بعد از شروع کار اندازه‌گیری گردید و داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین شاخص خنک‌کنندگی باد، ۳۲۳/۶۳ کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، دمای معادل خنک‌کنندگی باد (WCET یا Wind chill equivalent temperature)، ۲۰/۳ درجه سانتی‌گراد، شاخص حداقل عایق مورد نیاز ۰/۹۳ کلو و شاخص استرین سرمایی ۲/۱۵ است. بر اساس نتایج شاخص‌های استرس سرمایی، می‌توان گفت که شاغلان در مواجهه با استرس سرمایی قرار نداشتند.

نتیجه‌گیری: در دماهای بالا (بیش از ۱۰ درجه سانتی‌گراد) با شاخص خنک‌کنندگی کمتر از ۴۰۰ کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، امکان مواجهه کارگران با استرس سرمایی بسیار کم می‌باشد و شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین کارگران سنگبری بود.

واژه‌های کلیدی: شاخص‌های استرس سرمایی؛ شرایط جوی؛ سنگبری

ارجاع: سبزه‌علی سعید، حبیبی احسان‌اله، دهقان حبیب‌اله، فیضی آوات، سبزه‌علی حسین. ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیکی و ادراکی شرایط جوی کارگران سنگبری‌های شهرستان اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۴۰۵؛ ۲۲ (۲): ۳۶۳-۳۵۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۴/۱۵

پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۶/۵

دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۸/۸

مقدمه

شغلی رایج است و باعث بروز خطر آسیب‌های ناشی از سرما می‌شود (۶، ۱). سرما در محیط کار بسته و در محیط روباز می‌تواند منجر به اثرات متفاوتی بر سلامت انسان شود که کاهش عملکرد و بهروری، افزایش وقوع حوادث، ایجاد حس ناخوشایند و عدم آسایش از آن جمله می‌باشد (۸، ۷). در مجموع، سرما ممکن است باعث غیبت از کار به دلیل مرخصی استعلاجی شود (۷). در فصل زمستان مرگ و میر و بیماری‌های تنفسی افزایش می‌یابد (۸). شیوع علایم تنفسی مانند تنفس کوتاه، خس خس سینه، سرفه‌های طولانی و خلط سینه افرادی که در مناطق سرد سیر زندگی می‌کنند به میزان ۲۹-۲۵ درصد بیشتر است (۱۰، ۹). دردهای اسکلتی-عضلانی ناشی از شکایت‌های رایج گزارش شده در پژوهش Raatikka و همکاران در فصل زمستان بوده است (۹). شکایت‌های مرتبط شامل درد در شانه، گردن، زانو و کمر می‌باشد (۱۱). افزایش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در مطالعه Mäkinen و همکاران نیز مشاهده شد (۱۲). اثر سرما بر روی عملکرد ایمنی بدن در تحقیقات Shek و Shephard

سرما یکی از عوامل فیزیکی زیان‌آور محیط کار است که در بسیاری از نقاط جهان مواجهه با آن (به خصوص در فصل زمستان) یک خطر بزرگ برای مشاغل در فضاهای باز محسوب می‌شود (۱). کار در شرایطی که باعث ایجاد احساس ناراحتی ناشی از سرما می‌شود را کار در شرایط سرد می‌نامند. در کار بدنی سنگین، این حالت در دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد یا کمتر از آن اتفاق می‌افتد (۲). استانداردهای بین‌المللی دیگر کار در سرما را کار در دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌گویند (۴، ۳). مواجهه با سرمای داخل ساختمان‌ها می‌تواند در فرایندهای صنایع غذایی ایجاد شود و مواجهه با سرمای بیرونی می‌تواند در مشاغل مانند کشاورزان، معدن‌کاران، جنگلبانان و ساختمان‌سازی به وجود آید (۵). مواجهه با سرما می‌تواند بر حسب نواحی بدن نیز متفاوت باشد. به طور مثال می‌تواند محدود به قسمت‌های انتهایی بدن (سر-دست و پا) گردد که در اثر تماس با اجسام سرد افزایش می‌یابد. این نوع از خنک‌شوندگی در فعالیت‌های

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۲- استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۳- دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۴- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده مسؤول: سعید سبزه‌علی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Email: sabzehalaeid@yahoo.com

(۱۳) و Maniero و Carey (۱۴) گزارش شده است.

کاهش چابکی مشکلی جدی در کارهای دستی در طی مواجهه طولانی مدت با سرما به شمار می‌رود (۱۵). کاهش چابکی انگشتان دست در پژوهش Daanen مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این بود که در دمای معادل خنک‌کنندگی باد (Wind chill equivalent temperature یا WCET) کمتر از ۲۰- درجه سانتی‌گراد، عملکرد وظایف یدی کاهش می‌یابد که این کاهش ۱۲ درصد بود. در این حالت، دمای انگشتان کمتر از ۱۴ درجه سانتی‌گراد بود (۱۶).

عملکرد ذهنی نقش مهمی در زمینه‌های گوناگون از جمله ایمنی، تصمیم‌گیری و بهره‌وری در کار دارد و مواجهه با سرما می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد ذهنی و شناختی تأثیرگذار باشد (۱۷، ۱۸). از جمله شاخص‌های ارزیابی مواجهه انسان با سرما، می‌توان به WCI، دمای معادل خنک‌کنندگی (Equivalent chill temperature یا ECT) و شاخص میزان عایق لباس مورد نیاز (Required clothing insulation یا IREQ) اشاره کرد (۲۱-۱۹). از جمله مشاغلی که با استرس سرمایی مواجهه دارند، کارگران سنگبری می‌باشند. با توجه به تأثیر سرما بر بیماری‌های قلبی-عروقی، بهره‌وری کار، عدم آسایش کارگر، عملکردهای ذهنی و فیزیکی، غیبت از کار، چابکی، نیروی چنگش و در نهایت، ایمنی در محیط کار و وقوع حوادث و همچنین، با توجه به این که کارگران شاغل در سنگبری به دلیل نوع کارشان در معرض سرما قرار دارند و مطالعات اندکی در این حرفه صورت گرفته است، تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت تنش سرمایی کارگران سنگبری در شهرستان اصفهان انجام شد.

روش‌ها

این پژوهش تحلیلی-مقطعی بر روی ۳۰ نفر از کارگران سنگبری‌های شهرستان اصفهان انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه شامل نداشتن سابقه بیماری‌های قلبی-عروقی، مشکلات تنفسی، نداشتن سابقه مصرف سیگار، دیابت، نداشتن سابقه مصرف داروهای قلبی، ضد افسردگی، ضد هیستامین، ضد پارکینسون و سایر داروها بود. عدم تمایل به ادامه همکاری نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد. بعد از انتخاب افراد، مشخصات دموگرافیک شامل نام و نام خانوادگی، سابقه کار، تحصیلات، سن، جنسیت، وزن و قد توسط کارگران تکمیل گردید و در اهداف تحقیق توضیحات لازم به کارگران ارایه شد.

جهت بررسی وضعیت حرارتی محیط و تأثیر آن بر انسان، از شاخص‌های استرین حرارتی از جمله دمای عمقی و سطحی بدن، ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و شاخص استرین سرمایی (Cold strain index یا CSI) به شرح زیر استفاده گردید. برای هر کارگر در نوبت کاری صبح دمای پوست و عمقی بدن، فشار خون، ضربان قلب و متغیرهای محیطی مانند دمای هوا، میزان رطوبت و سرعت جریان هوا قبل از شروع به کار، یک ساعت بعد از شروع به کار (دقیقه ۶۰ مواجهه با شرایط جوی محیط کار) و همچنین، پس از گذشت دو ساعت از شروع کار (دقیقه ۱۲۰ مواجهه با شرایط جوی محیط کار) بر طبق استاندارد ISO 9886 اندازه‌گیری شد. در این نوبت، احساس سرمایی در قسمت دست، پا و سر و صورت نیز مورد سنجش قرار گرفت. به منظور سنجش CSI، میانگین دمای پوست (Tsk) و دمای عمقی

(Tcor) قبل از مواجهه و حین مواجهه به دست آمد و با استفاده از رابطه ۱، این شاخص بر مبنای مقیاس صفر تا ۱۰ در پنج طبقه‌بندی شامل «استرین ندارد، استرین جزئی، استرین کم، استرین متوسط، استرین زیاد و استرین خیلی زیاد» به دست آمد (۲۲).

$$CSI = 6.67 (T_{cor} - T_{cor0}) (35 - T_{cor0}) - 1 + 3.33 (T_{sk} - T_{skn0}) (20 - T_{skn0}) - 1 \quad \text{رابطه ۱}$$

با توجه به این که میزان چربی زیر پوست بر دمای سطحی بدن و در نتیجه، بر چابکی و قدرت چنگش مؤثر است، میزان درصد چربی کارگران مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بدین منظور، چین‌های پوستی سه سر بازو (X1) و کتف (X2) با استفاده از کالیبر بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری و با استفاده از رابطه ۲ درصد چربی بدن محاسبه شد (۲۳). با توجه به تأثیر سرما بر نیروی چنگش، این شاخص نیز با استفاده از دینامومتر مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

$$\text{رابطه ۲} \quad 1/47 + (X1 * 0/43) + (X2 * 0/58) = \text{درصد چربی بدن}$$

در مرحله بعد، جهت ارزیابی وضعیت حرارتی محیط، اثر سرما بر بدن، واکنش انسان به آن و سطح استرس سرمایی، از WCI و IREQ استفاده گردید. به منظور تعیین این شاخص، پس از به دست آوردن سرعت جریان هوا (V) و دمای خشک (ta) محیط، از رابطه ۳ استفاده شد.

$$WCI = (33 - ta) (10 \cdot V^{0.16} - V + 10/45) \quad \text{رابطه ۳}$$

واحد سرعت جریان هوا متر بر ثانیه و واحد دمای خشک درجه سانتی‌گراد و WCI بر حسب کیلوکالری بر مترمربع در ساعت است. با توجه به این که این شاخص به تنهایی برای تعیین میزان مواجهه افراد کاربرد ندارد، طبق رابطه ۴ به ECT (دمای هوا در شرایط جریان هوای آرام و با سرعت جریان کمتر از ۱/۸ متر بر ثانیه) تبدیل گردید و در نهایت، برای قضاوت در مورد اثر شاخص خنک‌کنندگی باد از استاندارد ISO 1993 استفاده شد (۲۴).

$$33 - \frac{WCI}{25/5} = CET \quad \text{رابطه ۴}$$

واحد شاخص خنک‌کنندگی باد در این رابطه بر حسب وات بر مترمربع می‌باشد. به منظور تعیین سطح استرس سرمایی، IREQ مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص آثار دمای هوا، میانگین دمای تابشی، رطوبت، سرعت جریان هوا و گرمای متابولیکی را با هم ادغام و مقدار تنش را بیان می‌کند. بدین منظور، می‌توان از رابطه ۵ و همچنین، از نمودارهای معرفی شده به وسیله ISO 110791 استفاده کرد که در مطالعه حاضر از نمودارهای ISO (۲۵) استفاده شد.

$$IREQ = \frac{tsk - tcl}{M - W - Hres - E} \quad \text{رابطه ۵}$$

در رابطه ۵، tsk متوسط دمای پوست، tcl دمای سطحی پوشش داده شده، M میزان متابولیسم، W نرخ کار مکانیکی، Hres از دست دادن گرما از طریق تنفس و E از دست دادن گرما از طریق تبخیر می‌باشد. بعد از انجام مراحل فوق، داده‌های به دست آمده در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ (version 26, IBM Corporation, Armonk, NY) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

میانگین سنی افراد مورد بررسی $38/00 \pm 11/28$ سال، میانگین سابقه کاری آنان $7/29 \pm 8/00$ سال و میانگین قد و وزن آن‌ها به ترتیب $173/50 \pm 0/07$ سانتی‌متر و $71/55 \pm 12/53$ کیلوگرم بود. میانگین شاخص توده بدن (BMI یا Body mass index) شرکت‌کنندگان $10/38 \pm 18/81$ کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد که در محدوده نرمال قرار داشت. همچنین، ۱۸ درصد از این افراد بی‌سواد، ۶۰ درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۱۶ درصد دیپلم و ۵ درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی بودند. نتایج پاسخ‌های فیزیولوژیک افراد شامل دمای عمقی، دمای پوست، ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در جدول ۱ ارائه شده است.

لازم به ذکر است که میانگین درصد چربی بدن افراد مورد بررسی، $6/10 \pm 20/71$ درصد گزارش شد که با توجه به حد استاندارد توصیه شده برای مردان (۱۸-۲۶ درصد)، نمونه‌ها دارای چربی اضافه نبودند. در جدول ۲ نتایج اندازه‌گیری شاخص‌های محیطی هوا ارائه شده است.

بر اساس داده‌های جدول ۳، میزان Icl (عامل مقاومت لباس) بیشتر از IREQ min می‌باشد که نشان می‌دهد لباس، عایق کافی در مقابل سرما ایجاد کرده است و شاغلان دچار استرس سرمایی نشده‌اند. با توجه به نمودار تعیین شاخص خنک‌کنندگی باد در ناحیه ۳۰۰-۴۰۰ کیلوکالری بر مترمربع در ساعت و WCET در ناحیه خنثی تا مختصری خنک قرار داشت و خطر استرس سرمایی و یخ‌زدگی اندام برای فرد وجود نداشت.

نتایج ضریب همبستگی مربوط به شاخص‌های استرس سرمایی و پاسخ‌های فیزیولوژیک اندازه‌گیری شده در افراد در جدول ۴ ارائه شده است. بر این اساس،

آزمون همبستگی Pearson نشان داد که بین شاخص خنک‌کنندگی باد و ضربان قلب ($P = 0/036$)، دمای انگشتان پا ($P = 0/001$) و دمای انگشتان دست ($P = 0/052$) رابطه معنی‌داری وجود داشت. با توجه به ضریب همبستگی بین شاخص‌های استرس سرمایی با پاسخ‌های فیزیولوژیک، IREQ بالاترین همبستگی را با پاسخ‌های فیزیولوژیک بدن شاغلان نشان داد.

بین دمای هوا با نیروی چنگش رابطه معنی‌دار و مستقیمی مشاهده گردید؛ بدین معنی که با کاهش دمای هوا، میزان نیروی چنگش نیز کاهش یافت، اما رابطه دمای هوا با دمای عمقی معنی‌دار نبود.

بحث

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت تنش سرمایی در شاغلان کارخانجات سنگبری اصفهان صورت گرفت. در مطالعه حاضر دمای هوا با دمای سطحی بدن رابطه مستقیمی داشت ($P = 0/008$ ، $r = 0/42$)، اما بین دمای هوا با دمای عمقی، ضربان قلب و فشار خون رابطه معنی‌داری مشاهده نشد که علت آن می‌تواند وجود دمای هوای بالاتر در بررسی حاضر باشد؛ چرا که تأثیر دمای هوا بر دمای عمقی بدن، ضربان قلب و فشار خون در دماهای خیلی پایین‌تر اتفاق می‌افتد. تحقیق Cortili و همکاران نیز می‌تواند مؤید این علت باشد؛ چراکه در دمای خیلی پایین (۲- و ۲۰- درجه سانتی‌گراد) این تأثیر نمایان شد. در پژوهش Kim و همکاران مشاهده گردید که در شرایط دمایی خیلی سرد (۲۵- درجه سانتی‌گراد)، میزان شاخص‌های محیطی مانند دمای عمقی و دمای سطحی به طور معنی‌داری کاهش و پاسخ‌های فیزیولوژیک از جمله فشار خون و ضربان قلب افزایش می‌یابد (۲۶).

جدول ۱. مقادیر پاسخ‌های فیزیولوژیک در کارگران سنگبری در حین فعالیت

متغیر	زمان مواجهه با شرایط جوی محیط کار	میانگین \pm انحراف معیار	حد اقل	حد اکثر
دمای عمقی (درجه سانتی‌گراد)	قبل از مواجهه	$36/41 \pm 0/46$	۳۵/۳	۳۷/۲
	دقیقه ۶۰	$35/92 \pm 1/18$	۳۱/۶	۳۷/۴
	دقیقه ۱۲۰	$36/16 \pm 0/84$	۳۲/۶	۳۷/۴
دمای پوست (درجه سانتی‌گراد)	قبل از مواجهه	$35/70 \pm 1/80$	۲۷/۹	۳۷/۰
	دقیقه ۶۰	$35/21 \pm 0/97$	۳۲/۲	۳۶/۵
	دقیقه ۱۲۰	$35/42 \pm 1/08$	۳۱/۷	۳۸/۸
ضربان قلب (تپش در دقیقه)	قبل از مواجهه	$74/42 \pm 9/40$	۵۷	۱۰۱
	دقیقه ۶۰	$83/94 \pm 13/30$	۶۱	۱۲۶
	دقیقه ۱۲۰	$78/68 \pm 11/93$	۵۸	۱۱۱
فشار خون سیستولیک (میلی‌متر جیوه)	قبل از مواجهه	$130/13 \pm 17/68$	۱۰۳	۱۶۷
	دقیقه ۶۰	$139/26 \pm 17/60$	۱۰۵	۱۹۷
	دقیقه ۱۲۰	$139/05 \pm 15/05$	۱۰۸	۱۸۶
فشار خون دیاستولیک (میلی‌متر جیوه)	قبل از مواجهه	$84/08 \pm 13/91$	۵۹	۱۲۰
	دقیقه ۶۰	$87/87 \pm 13/16$	۴۵	۱۳۰
	دقیقه ۱۲۰	$87/95 \pm 13/61$	۶۲	۱۳۹
شاخص نمره استرس سرمایی	دقیقه ۶۰	$2/09 \pm 1/20$	۰/۵	۴/۷
	دقیقه ۱۲۰	$1/57 \pm 0/55$	۰/۷	۲/۶

جدول ۲. مقادیر شاخص‌های محیطی در کارگران سنگبری در حین فعالیت

متغیر	زمان مواجهه با شرایط جوی محیط کار	میانگین \pm انحراف معیار	حداقل	حد اکثر
دمای هوا (درجه سانتی‌گراد)	قبل از مواجهه	$19/37 \pm 2/01$	۱۷/۰	۲۴/۹
	دقیقه ۶۰	$10/22 \pm 2/97$	۴/۲	۱۶/۰
	دقیقه ۱۲۰	$11/00 \pm 2/11$	۶/۵	۱۴/۵
رطوبت نسبی (درصد)	قبل از مواجهه	$24/07 \pm 10/11$	۴/۸	۳۹/۵
	دقیقه ۶۰	$47/31 \pm 15/40$	۲۸/۶	۷۸/۴
	دقیقه ۱۲۰	$44/63 \pm 16/18$	۲۰/۵	۸۵/۵
سرعت جریان هوا (متر بر ثانیه)	قبل از مواجهه	$0/02 \pm 0/03$	-۰/۱	-۰/۳
	دقیقه ۶۰	$0/16 \pm 0/09$	-۰/۶	-۰/۴
	دقیقه ۱۲۰	$0/18 \pm 0/14$	-۰/۳	-۰/۶

در مطالعه Rintamäki و Rissanen نیز ارتباط مستقیم دمای عمقی و دمای سطحی بدن با دمای هوا مشاهده شد؛ به طوری که در دمای -۲۵ درجه سانتی‌گراد، دمای پوست به ۲۵ درجه سانتی‌گراد و در دمای -۱۵ درجه سانتی‌گراد، دمای انگشتان دست به ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید (۲۷). در تحلیل شاخص‌های محیطی و بر اساس نتایج تحقیق حاضر، با افزایش شاخص خنک‌کنندگی باد، ضربان قلب نیز افزایش یافت ($P = 0/036$)، اما این افزایش بر روی فشار خون تأثیری نداشت. همچنین، این شاخص با دمای انگشتان پا نیز دارای رابطه معنی‌دار و معکوس بود ($r = -0/52, P = 0/001$) و با WCET دارای رابطه معنی‌دار و مستقیمی بود ($r = 0/32, P = 0/040$).

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با یافته‌های تحقیقات Budd و War haft (۲۸) و Zhang و همکاران (۲۹) که حاکی از تأثیر دمای محیط بر ضربان قلب بود، همخوانی داشت.

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با یافته‌های تحقیقات Budd و War haft (۲۸) و Zhang و همکاران (۲۹) که حاکی از تأثیر دمای محیط بر ضربان قلب بود، همخوانی داشت.

جدول ۳. مقادیر شاخص‌های استرس سرمای در کارگران سنگبری در حین فعالیت

متغیر	زمان مواجهه با شرایط جوی محیط کار	میانگین \pm انحراف معیار	حداقل	حد اکثر
شاخص خنک‌کنندگی باد (کیلوکالری بر مترمربع در ساعت)	قبل از مواجهه	$159/7 \pm 24/1$	۹۵/۹	۲۰۸/۲
	دقیقه ۶۰	$323/6 \pm 54/8$	۲۱۳/۰	۴۴۷/۷
	دقیقه ۱۲۰	$313/6 \pm 47/0$	۲۲۹/۶	۴۴۷/۸
WCET	قبل از مواجهه	$26/7 \pm 0/9$	۲۴/۸	۲۹/۲
	دقیقه ۶۰	$20/3 \pm 2/2$	۱۵/۴	۲۴/۶
	دقیقه ۱۲۰	$20/7 \pm 1/8$	۱۵/۵	۲۴/۰
IREQ min	قبل از مواجهه	$0/4 \pm 0/3$	۰/۰۲	-۰/۱
	دقیقه ۶۰	$0/9 \pm 0/3$	-۰/۵	۱/۳
	دقیقه ۱۲۰	$0/9 \pm 0/3$	-۰/۵	۱/۴
عامل مقاومت لباس در برابر حرارت (Icl)	قبل از مواجهه	۱/۴	-	-
	دقیقه ۶۰			
	دقیقه ۱۲۰			
عیق مورد نیاز جهت حفظ تعادل حرارتی بدن (IREQ neutral)	قبل از مواجهه	$0/2 \pm 0/1$	۰/۱	-۰/۳
	دقیقه ۶۰	$1/2 \pm 0/33$	-۰/۶	۱/۵
	دقیقه ۱۲۰	$1/1 \pm 0/3$	-۰/۷	۱/۵
شاخص نمره استرس سرمای	دقیقه ۶۰	$2/2 \pm 1/2$	۰/۵	۴/۷
	دقیقه ۱۲۰	$1/6 \pm 0/6$	-۰/۷	۲/۶

WCET: Wind chill equivalent temperature; IREQ: Required clothing insulation

جدول ۴. ضریب همبستگی Pearson بین متغیرهای مورد بررسی در شاغلان سنگبری

متغیر	شاخص خنک‌کنندگی باد	WCET	IREQ
شاخص خنک‌کنندگی باد	-	-	$r = 0.38, P = 0.016$
WCET	$r = -0.1$	-	$r = 0.40, P = 0.012$
ضربان قلب	$r = 0.33, P = 0.036$	رابطه ندارد.	$r = 0.73, P = 0.001$
دمای سطحی پوست	$r = 0.30, P = 0.060$	$r = -0.16, P = 0.030$	$r = 0.38, P = 0.018$
فشار خون	رابطه ندارد.	رابطه ندارد.	رابطه ندارد.
دمای عمقی	رابطه ندارد.	رابطه ندارد.	رابطه ندارد.
دمای انگشتان پا	$r = 0.52, P = 0.001$	$r = 0.36, P = 0.001$	$r = -0.28, P = 0.080$
شاخص استرین سرمایی	رابطه ندارد.	رابطه ندارد.	$r = 0.82, P = 0.001$

WCET: Wind chill equivalent temperature; IREQ: Required clothing insulation

نشد و دلیل آن می‌تواند درصد چربی پایین کارگران سنگبری باشد که به طور میانگین ۲۰ درصد و در محدوده قابل قبول قرار داشت. با توجه به این که مطالعه حاضر در محیط کاری (غیر آزمایشگاهی) انجام شد، در اختیار گرفتن کارگران جهت اندازه‌گیری شاخص‌های فیزیولوژیک در حین کار از جمله محدودیت‌ها بود که با اقتناع کارفرما درباره اهمیت تحقیق و همکاری کارگران مرتفع گردید.

نتیجه‌گیری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر درباره ارزیابی وضعیت تنش سرمایی و شاخص‌های فیزیولوژیک مربوطه، مشاهده شد که کارگران شاغل در سنگبری‌های مورد بررسی در فصل سرد دچار استرس سرمایی نبودند؛ چرا که در دماهای بالاتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد با شاخص خنک‌کنندگی کمتر از ۴۰۰ کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، امکان مواجهه کارگران با استرس سرمایی بسیار کم می‌شود. علاوه بر این، مشاهده شد که IREQ نسبت به دیگر شاخص‌های استرس سرمایی دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین کارگران سنگبری می‌باشد.

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با شماره ۱۹۸۳۰۸ می‌باشد که با کد اخلاق IRMUIRESEARCHREC.1399079 تحت حمایت معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تصویب رسید. بدین وسیله از همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران شاغل در سنگبری‌های اصفهان تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

در پژوهش Moran و همکاران که با هدف ارزیابی شاخص‌های استرس محیطی با استفاده از متغیرهای فیزیولوژیک و شاخص استرین فیزیولوژیک در متابولیسم‌های مختلف صورت گرفت نیز همبستگی بین شاخص‌های استرس سرمایی با پاسخ‌های فیزیولوژیک از جمله ضربان قلب نشان داده شد (۲۲). در ارزیابی ارتباط میزان عایق مورد نیاز با دیگر شاخص‌های ارزیابی سرما بر اساس داده‌های جدول ۴، IREQ همبستگی بالایی را با شاخص‌های فیزیولوژیک از جمله دمای سطحی پوست و ضربان قلب و دیگر شاخص‌های استرس سرمایی مانند شاخص خنک‌کنندگی باد، شاخص استرین سرمایی و WCET نشان داد. بر همین اساس، سازمان بین‌المللی استاندارد، IREQ را به عنوان شاخص اصلی استرس سرمایی معرفی کرده است. این نتایج با یافته‌های مطالعه ساعدیناه و همکاران که بر روی شاغلان مکانیک خودرو صورت گرفت (۳۰)، هم‌راستا می‌باشد. لازم به ذکر است که کاهش دمای سطحی بدن به ویژه در کف دست، منجر به کاهش چابکی و قدرت چنگش دست می‌گردد. کاهش عملکرد وظایف یدی در تحقیق Daanen وقتی دمای انگشتان کمتر از ۱۴ درجه سانتی‌گراد بود، ۱۲ درصد تخمین زده شد (۱۶). در پژوهش حاضر نیز دمای سطحی پوست و دمای هوا به ترتیب با نیروی چنگش رابطه مستقیم و معنی‌داری داشت و با کاهش دمای هوا ($P = 0.048$) و دمای سطحی پوست ($P = 0.014$)، نیروی چنگش نیز کاهش یافت.

در بررسی میزان چربی زیرپوستی نیز می‌توان گفت با توجه به این که افزایش چربی زیرپوست مانند لایه عایقی بین سطح پوست و بافت‌های عمقی به ویژه در اندام‌های انتهایی، شکم و تنه عمل می‌کند و این لایه چربی به طور تئوریک انتقال حرارت از طریق رسانش را از عضلات به سطح پوست کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که دمای عمقی نیز افزایش یابد، اما در پژوهش حاضر بین درصد چربی بدن با دمای عمقی بدن رابطه مستقیم و معنی‌داری مشاهده

References

- Holmér I. Evaluation of cold workplaces: an overview of standards for assessment of cold stress. *Industrial Health*. 2009; 47(3): 228-34.
- International Organization for Standardization. *Ergonomics of the Thermal Environment: Cold Workplaces: Risk Assessment and Management*. ISO; 2008.
- BS 7915. *Ergonomics of the thermal environment: guide to design and evaluation of working practices for cold indoor environments*.
- Mäkinen TM. *Human cold exposure, adaptation and performance in a northern climate*. University of Oulu; 2006.

5. Mäkinen TM, Raatikka VP, Rytönen M, Jokelainen J, Rintamäki H, Ruuhela R, Näyhä S, Hassi J. Factors affecting outdoor exposure in winter: population-based study. *International journal of biometeorology*. 2006; 51(1): 27-36.
6. Holmér I. Assessment of cold exposure. *International journal of circumpolar health*. 2001; 60(3): 413-21.
7. Mäkinen TM, Hassi J. Health problems in cold work. *Industrial health*. 2009; 47(3): 207-20.
8. Schwartz J. Who is sensitive to extremes of temperature? A case-only analysis. *Epidemiology*. 2005; 16(1): 67-72.
9. Raatikka VP, Rytönen M, Näyhä S, Hassi J. Prevalence of cold-related complaints, symptoms and injuries in the general population: the FINRISK 2002 cold sub study. *International journal of biometeorology*. 2007; 51(5): 441-8.
10. Harju T, Mäkinen T, Näyhä S, Laatikainen T, Jousilahti P, Hassi J. Cold-related respiratory symptoms in the general population. *The clinical respiratory journal*. 2010; 4(3): 176-85.
11. Piedrahita H. Working in cold conditions indoors: effects on musculoskeletal symptoms and upper limb movements (Doctoral dissertation, Lulea Tekniska University).
12. Mäkinen TM, Palinkas LA, Reeves DL, Pääkkönen T, Rintamäki H, Leppäluoto J, Hassi J. Effect of repeated exposures to cold on cognitive performance in humans. *Physiology & behavior*. 2006; 87(1): 166-76.
13. Shephard RJ, Shek PN. Cold exposure and immune function. *Canadian journal of physiology and pharmacology*. 1998; 76(9): 828-36.
14. Maniero GD, Carey C. Changes in selected aspects of immune function in the leopard frog, *Rana pipiens*, associated with exposure to cold. *Journal of Comparative Physiology B*. 1997; 167(4): 256-63.
15. Müller R. Arbeit in Kälte: insbesondere beim Löschen von Frost- u. Frischfisch. *Wirtschaftsverl. NW*; 1982.
16. Daanen HA. Manual performance deterioration in the cold estimated using the wind chill equivalent temperature. *Industrial Health*. 2009; 47(3): 262-70.
17. Palinkas LA. Mental and cognitive performance in the cold. *International Journal of Circumpolar Health*. 2001; 60(3): 430-9.
18. Pilcher JJ, Nadler E, Busch C. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. *Ergonomics*. 2002; 45(10): 682-98.
19. Carder M, McNamee R, Beverland I, Elton R, Cohen GR, Boyd J, et al. The lagged effect of cold temperature and wind chill on cardiorespiratory mortality in Scotland. *Occup Environ Med*. 2005; 62(10): 702-10.
20. Parsons K. Human thermal environments, the effects of hot, moderate, and cold environments on human health, comfort, and performance. 3rd ed. New York: Taylor & Francis Group; 2002
21. Kuklane K, Gao C, Holmér I, Giedraityte L, Bröde P, Candas V, et al. Calculation of clothing insulation by serial and parallel methods: effects on clothing choice by IREQ and thermal responses in the cold. *Int J Occup Saf Ergon*. 2007; 13(2): 103-16.
22. Moran DS, Castellani JW, O'Brien C, Young AJ, Pandolf KB. Evaluating physiological strain during cold exposure using a new cold strain index. *Am J Physiol*. 1999; 277(2): R556-64.
23. Farajzadeh S. Sports geomorphologic. Tehran: Publication of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran; 1985. [In Persian].
24. Apte M. Comparison between required clothing insulation and that actually worn by workers exposed to artificial cold. *Appl Ergon*. 1988; 19(4): 301-5.
25. ISO 11079. Ergonomics of the thermal environment determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.
26. Cortili G, Mognoni P, Saibene F. Work tolerance and physiological responses to thermal environment wearing protective NBC clothing. *Ergonomics*. 1996; 39(4): 620-33.
27. Rissanen S, Rintamäki H. Cold and heat strain during coldweather field training with nuclear, biological, and chemical protective clothing. *Mil Med*. 2007; 172(2): 128-32.
28. Budd GM, Warhaft N. Body temperature, shivering, blood pressure and heart rate during a standard cold stress in Australia and Antarctica. *J Physiol*. 1966; 186(1): 216-32.
29. Zhang X, Zhang S, Wang C, Wang B, Guo P. Effects of moderate strength cold air exposure on blood pressure and biochemical indicators among cardiovascular and cerebrovascular patients. *Int J Environ Res Public Health*. 2014; 11(3): 2472-87.
30. Saedpanah, Keivan, et al. Study of Exposure to Cold Stress and Physiological Responses in Auto Mechanics in Hamadan, Iran. *Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume*, 2017, 4(2): 7-17.