

ارتباط میان میزان مصرف روغن‌های گیاهی با سطوح آپولیپروتئین‌ها و چربی‌های سرمه در ایرانیان

پریسا حاجی‌هاشمی^۱، پروانه صانعی^۱، حسین خسروی بروجنی^۲، نضال صراف زادگان^۳، نوشین محمدی فرد^۴، فیروزه سجادی^۵، صدیقه عسگری^۶، مریم مقرون^۷، حسن علیخاصلی^۸
احمد اسماعیل زاده^۹

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: اثرات مضر روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه بر روی آپولیپروتئین‌ها از چندین قسمت دنیا گزارش شده است، ولی اطلاعات اندکی از خاورمیانه در دسترس می‌باشد. این مطالعه با هدف، ارزیابی ارتباط میان نوع روغن‌های گیاهی، چربی‌ها و سطوح آپولیپروتئین‌ها سرمه در ایرانیان صورت گرفت.

روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، اطلاعات ۱۷۷۲ فرد (۷۹۵ مرد و ۹۷۷ زن) تا ۸۱ ساله که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشای چند مرحله‌ای از سه شهرستان اصفهان، نجف‌آباد و اراک در «برنامه قلب سالم اصفهان» (Isfahan healthy heart program) یا (IHHP) انتخاب شدند، استفاده شد. برای ارزیابی دریافت‌های غذایی معمول شرکت کنندگان، از پرسشنامه بسامد خوراک معتبر استفاده شد. مصرف روغن‌های گیاهی هیدروژنه (که برای پخت و پز در ایران استفاده می‌شوند) و مارگارین به عنوان گروه روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و مصرف روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کانولا به عنوان گروه روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه در نظر گرفته شدند. کلسترول (کل، LDL، HDL) سرم، تری‌گلیسرید و آپولیپروتئین‌های A و B به صورت ناشتا با روش‌های استاندارد اندازه گیری شدند.

یافته‌ها: شرکت کنندگان با بالاترین دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و غیر هیدروژنه نسبت به کسانی که دریافت پایین‌تری داشتند، جوان‌تر بوده و وزن کمتری داشتند. مصرف بالای روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و غیر هیدروژنه با دریافت پایین‌تر اثری، کربوهیدرات، فیر غذایی و دریافت بالای میوه‌ها، سبزیجات، گوشت، شیر و غلات همراه بود. هیچ تفاوت معنی‌داری در سطوح آپولیپروتئین و چربی‌های سرم بین چارک‌های روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه و نیمه هیدروژنه پس از تعدیل مخدوشگرها بالقوه دیده نشد.

نتیجه‌گیری: هیچ ارتباط معنی‌داری بین دریافت روغن‌های گیاهی هیدروژنه و غیر هیدروژنه و سطوح آپولیپروتئین و چربی‌های سرم یافت نشد. مطالعات بیشتری برای بررسی این ارتباط نیاز می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: روغن‌های گیاهی، عوامل خطر قلبی-عروقی، چربی‌ها و آپولیپروتئین‌های سرم، رژیم غذایی

ارجاع: حاجی‌هاشمی پریسا، صانعی پروانه، خسروی بروجنی حسین، صراف زادگان نضال، محمدی فرد نوشین، سجادی فیروزه، عسگری صدیقه، مقرون مریم، علیخاصلی حسن، اسماعیل زاده احمد. ارتباط میان میزان مصرف روغن‌های گیاهی با سطوح آپولیپروتئین‌ها و چربی‌های سرم در ایرانیان. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۳۹۱؛ ۸(۶): ۹۷۱-۹۵۹.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۸/۱۵

دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۶/۱۲

- ۱- دانشجویی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
- ۳- استاد، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
- ۴- کارشناس ارشد، گروه تغذیه، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
- ۵- کارشناس، گروه تغذیه، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
- ۶- استاد، گروه علوم پایه، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
- ۷- دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسؤول)
Email: esmaillzadeh@hlth.mui.ac.ir

شده است (۱۳). مطالعات قبلی به طور کلی بر دوی چربی‌های ترانس و تأثیرات مضر آن‌ها بر سلامت متمرکز شده بودند (۱۴). دریافت بالای اسیدهای چرب ترانس در مقایسه با اسیدهای چرب غیر اشباع و اشباع منجر به غلظت بالاتر LDL-C و غلظت پایین‌تر HDL-C می‌شوند. همچنین دریافت بالای اسیدهای چرب ترانس با خطر بیشتر بروز بیماری‌های قلبی-عروقی مرتبط بوده است (۱۵). دریافت غذایی ایرانیان زمینه مناسبی را برای بررسی اثرات مضر چربی‌های ترانس فراهم می‌سازد. ایرانیان ۴/۲ درصد از انرژی خود را از اسیدهای چرب ترانس به دست می‌آورند که به طور تقریبی دو برابر مقدار دریافتی در کشورهای توسعه یافته است (۱۶).

بیش از ۷۵ درصد کل روغن‌های گیاهی که در ایران مصرف می‌شوند، روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه هستند که غنی از اسیدهای چرب ترانس و اشباع می‌باشند (۱۶). این نوع از دریافت غذایی می‌تواند شیوع بالای عوامل خطر قلبی-عروقی از قبیل سطوح بالای تری‌گلیسرید و غلظت پایین کلسترول HDL سرم در بین ایرانیان، در مقایسه با جوامع غربی را توجیه کند (۱۷). بررسی‌های قبلی در ایران، ارتباطات معنی‌داری بین مصرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و التهاب (۱۸)، سندروم متابولیک (۱۹) و عوامل خطر قلبی-عروقی (۲۰) را نشان داده‌اند. اثرات زیان‌آور روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه بر روی آپولیپوپروتئین‌ها نیز از چندین بخش گزارش شده است (۱۳، ۱۴)، ولی اطلاعات محدودی در این زمینه از مناطق تحت مطالعه خاورمیانه در دسترس می‌باشد. نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که تصویر بیماری‌های قلبی-عروقی و عوامل خطر آن در این بخش از دنیا در مقایسه با سایر نواحی متفاوت است (۲۱). اگر چه سطوح افزایش یافته کلسترول LDL و تام سرم شایع‌ترین عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در جوامع غربی هستند، اما به نظر می‌رسد سطوح تری‌گلیسرید بالا و HDL پایین سرم عوامل خطر اصلی در خاورمیانه می‌باشند (۲۲). بنابراین ارزیابی ارتباط روغن‌های گیاهی و سطوح آپولیپوپروتئین‌های سرم شاید اطلاعات بیشتری در مورد این

مقدمه

بیماری‌های قلبی-عروقی از علل عمدۀ مرگ و میر در جهان می‌باشد. نزدیک به ۸۰ درصد از مرگ و میرها در کشورهای توسعه یافته و ۲۵-۴۵ درصد از مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه را می‌توان به بیماری‌های قلبی-عروقی نسبت داد (۲، ۲).

کلسترول، Low density lipoprotein (LDL) بالا و High density lipoprotein (HDL) پایین فرد را مستعد بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت و دیگر بیماری‌های مزمن می‌سازد (۳). شواهد روزافزونی نشان می‌دهند که همه ذرات لیپوپروتئین‌ها از نظر خطر بیماری‌های قلبی-عروقی یکسان عمل نمی‌کنند. بنابراین عملکرد این ذرات، نسبت به سطح سرمی‌شان، شاخص دقیق‌تری برای پیش‌بینی خطر آتروواسکلروز (Atherosclerosis) می‌باشد (۴). آپولیپوپروتئین A مولکول اصلی است که در سطح HDL حمل می‌شود و سطوح پایین آن با خطر بالاتر بیماری‌های قلبی-عروقی همراه است (۵). از طرف دیگر، هر جزء کلسترول LDL در سطح خود یک مولکول ApoB، صرف نظر از محتوای کلسترول یا تری‌گلیسرید دارد (۶). بنابراین، سطوح ApoB به عنوان ذرات لیپوپروتئینی آتروژنیک در نظر گرفته می‌شود (۷). بسیاری از تحقیقات مشخص کرده‌اند که سطوح پلاسمایی آپولیپوپروتئین، نسبت به سطوح کلسترول LDL یا HDL پیشگویی بهتری برای خطر قلبی-عروقی می‌باشد (۸-۱۰). برای کاهش سطوح بالای کلسترول LDL، مداخلات رژیم غذایی به طور معمول به عنوان یک روش موفق پذیرفته شده است. مطالعات همه‌گیر شناختی نشان داده‌اند که تغییرات کوچکی در شیوه زندگی می‌توانند به طور معنی‌داری سطوح لیپوپروتئینی را بهبود بخشنند (۱۱). مطالعات ارزیابی ارتباط رژیم غذایی بیماری‌های قلبی-عروقی از مدت‌ها قبل بر چربی دریافتی افراد متمرکز شده‌اند. یک متابالیز نشان داده است، هنگامی که اسیدهای چرب غیر اشباع در رژیم غذایی جایگزین اسیدهای چرب اشباع می‌شوند، غلظت LDL و سطوح ApoB به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. کاهش معنی‌داری هم در غلظت HDL و سطوح ApoA گزارش

تأثیر قرار داد. برای هر یک از اقلام غذایی، شرکت کنندگان اندازه سهم و تکرار مصرف در یک سال قبل را گزارش کردند (۲۵). این اقلام روزانه (مانند نان)، هفتگی (مانند برنج و گوشت) و ماهانه (مانند ماهی) ثبت شدند. برای تحلیل اخیر، همه اقلام غذایی مصرفی با تقسیم مصرف هفتگی بر ۷ و ماهانه بر ۳۰ به مصرف روزانه تبدیل شدند. مصرف روغن‌های گیاهی هیدروژنه (که به طور معمول برای پخت و پز در ایران استفاده می‌شود) و مارگارین به عنوان گروه روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه در نظر گرفته شدند. مصرف روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کانولا به عنوان گروه روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه در نظر گرفته شدند.

ارزیابی چربی‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها

از شرکت کنندگان خواسته شد که به مدت ۱۲ ساعت قبل از نمونه‌گیری خون ناشتا باشند. نمونه‌های خون جمع‌آوری شده از هر یک از مراکز در سه شهر در ۲۰–۲۰ درجه سانتی‌گراد منجمد و در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت در آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان اندازه‌گیری‌ها انجام شدند. سطوح تری‌گلیسرید و کلسترول تام سرم به وسیله روش رنگ‌سننجی آنژیمی اندازه‌گیری گردید. بعد از رسوب کلسترول Non-HDL به وسیله کلرید منیزیم، سطح HDL در LDL هم با استفاده از معادله Friedewald محاسبه گردید (۲۵). اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌های سرم (ApoA، B) با استفاده از کیت‌های تجاری در دسترس انجام شد (کمپانی پارس آزمون، تهران، ایران).

بررسی دیگر متغیرها

اطلاعات مورد نیاز در مورد داده‌های مردم شناختی و اقتصادی-اجتماعی (جنس، سن، تحصیلات و شغل)، سوابق پزشکی و خانوادگی، استعمال دخانیات، فعالیت فیزیکی [با استفاده از پرسشنامه Baecke از فعالیت‌های فیزیکی معمول (۲۶)] و استفاده از داروها توسط مصاحبه کنندگان آموزش دیده با استفاده از روش چهره به چهره جمع‌آوری شد. اندازه‌گیری قد در حالتی که پاها به دیوار چسبیده بود و در حالت ایستاده توسط یک خطکش فلزی و متر نواری با دقیق

تفاوت فراهم می‌سازد. مطالعه حاضر با هدف، ارزیابی ارتباط میان نوع روغن‌های گیاهی دریافتی، سطوح آپولیپوپروتئین‌ها و چربی‌های سرم در ایرانیان انجام گرفت.

روش‌ها

شرکت کنندگان

مطالعه مقطعی حاضر در چهارچوب برنامه قلب سالم اصفهان (Isfahan healthy heart program) انجام شد. برنامه قلب سالم اصفهان یک برنامه جامع مبتنی بر جمیعت برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی-عروقی می‌باشد. این پروژه در سال ۱۳۷۸ شروع و در سال ۱۳۸۵ به پایان رسید (۲۴). مرکز تحقیقات قلب و عروق و دفتر سلامت استان اصفهان با همکاری یکدیگر این برنامه را اجرا کردند. در کل ۱۲۵۱۴ مرد و زن بالاتر از ۱۹ سال از سه شهرستان اصفهان، نجف آباد و اراک انتخاب شدند. از روش نمونه‌گیری خوش‌های تصادفی چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه‌ها استفاده شد. شرح کامل اطلاعات مربوط به فرایند انتخاب نمونه در مطالعات قبلی اشاره شده است (۲۴، ۲۳). مطالعه اخیر بر اساس داده‌های حاصل از اولین فاز IHHP انجام شد. برای این تحلیل، زیر گروهی از شرکت کنندگان IHHP انتخاب شدند که اطلاعات غذایی، سطوح چربی و آپولیپوپروتئین‌های سرم همراه با اطلاعات مربوط به متغیرهای مخدوشگر برای آن‌ها در دسترس بود. بنابراین ۱۷۷۲ فرد و ۹۷۷ زن (۱۹ تا ۸۱ ساله در مطالعه حاضر وارد شدند. رضایت‌نامه کتبی از تک‌تک شرکت کنندگان هنگامی که به کلینیک وارد شدند و پس از توضیح کامل پرتوکل مطالعه جمع‌آوری شد. این مطالعه موافقت کمیته اخلاق مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان و دیگر سازمان‌های مربوط را کسب کرد.

ارزیابی دریافت غذایی

دریافت‌های غذایی معمول شرکت کنندگان توسط تکنسین‌های آموزش دیده با استفاده از پرسشنامه سامد خوارک، حاوی ۴۹ قلم غذایی که به طور معمول توسط ایرانیان مصرف می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفت. مرکز توسعه آموزش پزشکی اعتبار این پرسشنامه را قبل از استفاده مورد

صرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن در جدول ۱ آمده است. افراد در بالاترین چارک دریافت روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن و روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن جوان‌تر بودند، وزن و شاخص توده بدنی پایین‌تری داشته و درصد کمتری از آن‌ها مرد بودند. هیچ تفاوت معنی‌داری در توزیع افراد سیگاری و تحصیل کرده در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن یافت نشد. دریافت‌های روزانه افراد مورد مطالعه در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن در جدول ۲ آمده است. مصرف بالای روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن و روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن با دریافت پایین‌تری از انرژی، کربوهیدرات و فیبر غذایی همراه بود. افراد در بالاترین چارک دریافت روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن و روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن درصد بیشتری از رژیم غذایی خود را از چربی دریافت کرده بودند. میانگین‌های تعديل شده خام و چند متغیره عوامل خطر قلبی-عروقی در چارک‌های مصرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن در جدول ۳ نشان داده شده است. در مدل خام، هیدروژن دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن داده شده است. در مدل انتخاب معمکوس معنی‌داری میان دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و سطوح تری‌گلیسرید، کلسترون و ApoB سرم یافت شد. به عبارت دیگر، آن‌هایی که در بالاترین چارک دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن بودند سطوح ApoB، تری‌گلیسرید و کلسترون پایین‌تری داشتند، ولی بعد از تعديل برای سن و کل انرژی دریافتی، ارتباطات از بین رفت. تعديل بیشتر برای مخدوشگرهای بالقوه از جمله دریافت‌های غذایی، ارتباطات را تغییر نداد. حتی بعد از تعديل اضافی برای شاخص توده بدنی، هیچ گونه ارتباط معنی‌داری بین دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و سطوح آپولیپوپروتئین‌ها و چربی‌های سرم یافت نشد.

دریافت بیشتر روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن با سطوح پایین‌تر تری‌گلیسرید سرم در ارتباط بود. این ارتباط بعد از تعديل برای سن و کل انرژی دریافتی ناپدید شد. تعديل اضافی برای مخدوشگرهای بالقوه هیچ ارتباط معنی‌داری بین

۱ سانتی‌متر انجام شد. اندازه‌گیری وزن با حداقل پوشش توسط ترازوی کالیبره شده (به وسیله ترازوی Seca) با دقت ۱۰۰ گرم انجام شد. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر^۲) محاسبه شد. دور کمر در کمترین محیط در زیر آخرین دنده و دور باسن در بیشترین محیط اندازه‌گیری شد.

روش‌های آماری

تحلیل‌های آماری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد (SPSS 16, version Inc., Chicago, IL). شرکت کنندگان بر اساس چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن گروه‌بندی شدند. خصوصیات عمومی شرکت کنندگان مطالعه در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن گروه‌بندی شدند. دریافت‌های غذایی تعديل شده برای انرژی و سن شرکت کنندگان در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن توسط آزمون ANOVA و χ^2 ارزیابی شدند. دریافت‌های غذایی تعديل شده برای انرژی و سن شرکت کنندگان در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن مقایسه شدند. برای به دست آوردن میانگین‌های تعديل شده چند متغیره چربی‌ها و آپولیپوپروتئین‌های سرم در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و غیر هیدروژن، مدل خطی عمومی در مدل‌های مختلف استفاده شد. در ابتدا، سن، جنس و کل انرژی دریافتی تعديل شد. تعديل بیشتر برای استعمال دخانیات، فعالیت فیزیکی و دریافت غذایی گوشت، غلات، میوه‌ها، سبزی‌ها، لبنتیات و اثرات متقابل روغن‌های گیاهی هیدروژن یا روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن صورت گرفت. به منظور بررسی این موضوع که آیا ارتباطات توسط چاقی میانجیگری می‌شوند، در یک مدل اضافی، شاخص توده بدنی در مدل گنجانده شد. مدل رگرسیون خطی چند متغیره با متغیرهای کمکی (کوواریانت‌ها) همان طور که پیش‌تر اشاره شد، برای ارزیابی بیش‌تر ارتباطات مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها

خصوصیات عمومی افراد مورد مطالعه در بین چارک‌های

جدول ۱: خصوصیات عمومی افراد مورد مطالعه در چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه*

†P	چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه***				چارک‌های روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه**				سن (سال)	
	Q _r	Q _r	Q _r	Q _r	P	Q _r	Q _r	Q _r		
< ۰/۰۵	۳۴/۲ ± ۱۳/۶	۳۶/۳ ± ۱۳/۰	۳۸/۵ ± ۱۵/۴	۴۱/۲ ± ۱۵/۳	< ۰/۰۵	۳۳/۹ ± ۱۳/۲	۳۶/۴ ± ۱۳/۵	۳۸/۶ ± ۱۵/۰	۴۱/۲ ± ۱۵/۶	وزن (کیلوگرم)
< ۰/۰۵	۶۶/۶ ± ۱۲/۰	۶۸/۳ ± ۱۳/۱	۶۹/۱ ± ۱۳/۴	۶۹/۸ ± ۱۲/۹	< ۰/۰۵	۶۶/۵ ± ۱۲/۲	۶۸/۲ ± ۱۳/۰	۶۸/۸ ± ۱۲/۳	۷۰/۱ ± ۱۲/۹	شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
< ۰/۰۵	۲۵/۲ ± ۴/۸	۲۵/۸ ± ۵/۳	۲۶/۴ ± ۵/۰	۲۶/۵ ± ۴/۵	< ۰/۰۶	۲۵/۵ ± ۵/۲	۲۵/۷ ± ۵/۲	۲۶/۵ ± ۴/۹	۲۶/۲ ± ۴/۶	ذکر (درصد)
< ۰/۰۵	۳۸/۴	۴۶/۲	۵/۹	۷۷/۰	< ۰/۰۵	۴۹/۲	۴۰/۸	۲/۴	۷۹/۳	فعالیت فیزیکی (MET × دقیقه/روز)
۰/۷۶	۸۵۶/۲ ± ۴۸۲	۸۵۱/۸ ± ۴۹۷	۸۱۳/۴ ± ۴۸۲	۸۴۵/۵ ± ۵۰۲	۰/۲۴	۸۱۹/۱ ± ۴۶۵	۸۷۵/۰ ± ۵۱۵	۸۰۲/۲ ± ۴۷۹	۸۷۰/۶ ± ۵۰۰	استعمال دخانیات (درصد)
۰/۶۴	۹/۲	۱۱/۶	۱۲/۷	۱۰/۸	۰/۰۹	۱۲/۰	۱۱/۲	۶/۸	۱۵/۱	تحصیلات (درصد)
۰/۲۲	۳۵/۰	۴۵/۹	۴۳/۱	۴۵/۰	۰/۱۴	۳۵/۸	۳۸/۵	۵۹/۲	۳۵/۹	۰-۵ سال
	۵۵/۱	۴۴/۷	۴۸/۸	۴۲/۴		۵۱/۳	۴۸/۸	۳۸/۰	۳۵/۹	۶-۱۲ سال
	۹/۹	۹/۴	۸/۱	۱۱/۵		۱۲/۹	۱۲/۷	۲/۹	۱۰/۲	بیشتر از ۱۲ سال

* داده‌ها شامل میانگین ± خطای استاندارد هستند

** روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه شامل: روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کانولا

*** روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه (به طور معمول در ایران برای پخت و پز استفاده می‌شود) و مارگارین

† از آزمون ANOVA برای متغیرهای پیوسته و ‡ برای متغیرهای رتبه‌ای استفاده شد

جدول ۲: دریافت‌های غذایی افراد مورد مطالعه در چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه*

†P	چارک‌های روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه***				P	چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه**				
	Q _r		Q _s			Q _r		Q _s		
	Q _r	Q _s	Q _r	Q _s		Q _r	Q _s	Q _r	Q _s	
< .001	۱۹۸۴/۴ ± ۹۱۷	۲۲۵۳/۵ ± ۸۰۹	۱۸۲۱/۳ ± ۱۰۰۶	۲۱۰۰/۶ ± ۸۹۴	< .001	۱۹۸۶/۲ ± ۹۰۲	۲۲۸۷/۱ ± ۸۵۴	۱۷۲۹/۳ ± ۹۴۰	۲۱۷۵/۵ ± ۸۹۶	
< .05	۵۶/۶ ± ۹/۵	۵۹/۱ ± ۱۱/۰	۶۲/۰ ± ۱۰/۵	۶۰/۹ ± ۱۲/۳	< .001	۵۹/۳ ± ۹/۴	۵۹/۲ ± ۱۱/۰	۶۲/۲ ± ۱۰/۳	۶۱/۰ ± ۱۲/۶	
.18	۱۲/۰ ± ۲/۲	۱۲/۱ ± ۲/۰	۱۲/۵ ± ۲/۴	۱۲/۵ ± ۲/۶	.07	۱۲/۱ ± ۲/۲	۱۲/۹ ± ۲/۰	۱۲/۵ ± ۲/۴	۱۲/۸ ± ۲/۶	
< .001	۲۹/۹ ± ۸/۳	۲۹/۸ ± ۹/۲	۲۷/۴ ± ۹/۴	۲۷/۴ ± ۱۰/۱	< .001	۲۹/۹ ± ۸/۲	۳۰/۰ ± ۹/۱	۲۷/۳ ± ۹/۳	۲۷/۲ ± ۱۰/۲	
< .001	۱۶/۵ ± ۹/۱	۱۹/۲ ± ۹/۳	۱۵/۰ ± ۸/۸	۱۸/۵ ± ۱۲/۲	< .001	۱۶/۸ ± ۹/۱	۱۹/۳ ± ۹/۸	۱۴/۷ ± ۹/۳	۱۸/۶ ± ۱۳/۲	
گروه‌های غذایی (تعداد دفعات در هفته)										
< .001	۸/۷ ± ۴/۹	۷/۳ ± ۴/۲	۶/۸ ± ۳/۹	۷/۱ ± ۴/۵	< .001	۸/۵ ± ۴/۶	۷/۴ ± ۴/۴	۷/۱ ± ۴/۵	۶/۸ ± ۴/۰	
< .001	۷/۴ ± ۴/۴	۶/۵ ± ۳/۹	۶/۰ ± ۲/۵	۶/۴ ± ۳/۴	< .001	۷/۵ ± ۴/۵	۶/۵ ± ۰/۸	۶/۲ ± ۳/۶	۶/۲ ± ۳/۴	
< .001	۷/۵ ± ۲/۸	۷/۰ ± ۳/۴	۶/۱ ± ۲/۱	۶/۳ ± ۳/۰	< .001	۷/۵ ± ۳/۹	۷/۰ ± ۲/۴	۶/۲ ± ۳/۲	۶/۱ ± ۲/۹	
< .001	۱/۱ ± ۲/۶	۰/۸ ± ۱/۹	۰/۴ ± ۱/۲	۰/۳ ± ۰/۸	< .001	۱/۱ ± ۲/۶	۰/۶ ± ۱/۹	۰/۴ ± ۱/۱	۰/۳ ± ۰/۸	
< .001	۲۴/۴ ± ۶/۰	۲۴/۴ ± ۵/۷	۲۲/۱ ± ۶/۱	۲۲/۳ ± ۶/۴	< .001	۲۴/۵ ± ۶/۱	۲۴/۲ ± ۵/۶	۲۲/۹ ± ۶/۳	۲۲/۴ ± ۶/۲	
< .001	۱/۹ ± ۲/۳	۲/۴ ± ۴/۳	۲/۳ ± ۲/۷	۴/۵ ± ۴/۳	< .001	۱/۶ ± ۳/۶	۲/۱ ± ۴/۱	۲/۲ ± ۳/۵	۴/۸ ± ۴/۸	
< .001	۱۹/۳ ± ۴/۴	۱۴/۱ ± ۱/۵	۸/۵ ± ۱/۹	۴/۴ ± ۲/۷	< .001	۱۴/۲ ± ۲/۲	۱۱/۸ ± ۳/۴	۷/۰ ± ۱/۵	۲/۶ ± ۲/۸	
Miyوه										
سبزیجات										
گوشت										
شیر										
غلات										
Non-HVO										
PHVO										

داده‌ها شامل میانگین ± خطای استاندارد هستند و تمام متغیرها برای سن و دریافت انرژی تعدیل شده‌اند*

** روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه شامل: روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کانولا

*** روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه (به طور معمول در ایران برای پخت و پز استفاده می‌شود) و مارگارین

† از آزمون ANCOVA استفاده شده است

Non-HVO: Non-hydrogenated vegetable oil; PHVO: Partially hydrogenated vegetable oil

جدول ۳: عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن*

†P	چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژن***				P	چارک‌های روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن**				قند خون
	Q _r	Q _r	Q _r	Q _r		Q _r	Q _r	Q _r	Q _r	
·/۱۳	۸۰/۵ ± ۱/۶	۸۲/۸ ± ۱/۸	۸۰/۴ ± ۱/۰	۸۴/۲ ± ۱/۳	·/۶۸	۸۱/۱ ± ۱/۶	۸۲/۵ ± ۱/۷	۸۱/۶ ± ۱/۳	۸۳/۶ ± ۱/۲	خام
·/۲۵	۸۱/۸ ± ۱/۴	۸۴/۲ ± ۱/۴	۸۰/۱ ± ۱/۴	۸۲/۸ ± ۱/۴	·/۵۶	۸۱/۹ ± ۱/۴	۸۲/۳ ± ۱/۴	۸۲/۳ ± ۱/۶	۸۰/۳ ± ۱/۶	مدل ۱
·/۲۵	۸۱/۸ ± ۱/۵	۸۴/۴ ± ۱/۵	۸۰/۲ ± ۱/۵	۸۲/۹ ± ۱/۵	·/۴۹	۸۲/۳ ± ۱/۵	۸۲/۵ ± ۱/۶	۸۲/۳ ± ۱/۶	۸۰/۲ ± ۱/۶	مدل ۲
·/۲۶	۸۲/۰ ± ۱/۵	۸۴/۴ ± ۱/۵	۸۰/۲ ± ۱/۵	۸۲/۸ ± ۱/۵	·/۵۱	۸۲/۳ ± ۱/۶	۸۲/۵ ± ۱/۵	۸۲/۴ ± ۱/۷	۸۰/۲ ± ۱/۷	مدل ۳
تری‌گلیسیرید										
< ·/۰۵	۱۵۷/۳ ± ۷/۶	۱۶۴/۹ ± ۷/۷	۱۶۶/۴ ± ۶/۷	۱۸۵/۸ ± ۶/۷	< ·/۰۵	۱۵۴/۳ ± ۷/۷	۱۶۷/۲ ± ۷/۸	۱۶۷/۴ ± ۵/۹	۱۸۵/۴ ± ۷/۴	خام
·/۱۸	۱۶۱/۶ ± ۷/۱	۱۶۹/۵ ± ۷/۱	۱۶۲/۱ ± ۷/۱	۱۸۱/۲ ± ۷/۱	·/۴۸	۱۶۱/۳ ± ۷/۱	۱۶۶/۹ ± ۷/۱	۱۷۷/۶ ± ۷/۸	۱۶۹/۶ ± ۷/۸	مدل ۱
·/۱۰	۱۶۷/۴ ± ۷/۱	۱۶۸/۶ ± ۶/۹	۱۵۶/۵ ± ۷/۰	۱۸۱/۰ ± ۷/۰	·/۳۱	۱۵۸/۶ ± ۷/۴	۱۶۶/۹ ± ۷/۱	۱۷۹/۸ ± ۸/۰	۱۶۹/۲ ± ۷/۹	مدل ۲
·/۱۱	۱۶۸/۴ ± ۷/۰	۱۶۸/۹ ± ۷/۰	۱۵۷/۷ ± ۷/۰	۱۸۱/۹ ± ۶/۹	·/۳۵	۱۵۸/۸ ± ۷/۲	۱۶۷/۰ ± ۷/۰	۱۷۸/۸ ± ۷/۸	۱۷۰/۶ ± ۷/۸	مدل ۳
کلسترول										
< ·/۰۵	۱۹۲/۲ ± ۳/۰	۱۸۸/۱ ± ۳/۲	۱۹۶/۸ ± ۲/۸	۲۰۰/۱ ± ۳/۰	·/۰۸	۱۹۰/۰ ± ۳/۰	۱۹۰/۸ ± ۳/۲	۱۹۷/۶ ± ۳/۰	۱۹۸/۹ ± ۳/۰	خام
·/۴۷	۱۹۵/۲ ± ۲/۹	۱۹۰/۵ ± ۲/۹	۱۹۴/۷ ± ۲/۹	۱۹۶/۹ ± ۲/۹	·/۹	۱۹۴/۴ ± ۲/۹	۱۹۴/۴ ± ۲/۹	۱۹۴/۰ ± ۳/۲	۱۹۴/۸ ± ۱۲/۲	مدل ۱
·/۴۴	۱۹۴/۶ ± ۲/۰	۱۹۰/۶ ± ۲/۰	۱۹۵/۴ ± ۲/۰	۱۹۷/۵ ± ۲/۰	·/۹۶	۱۹۳/۴ ± ۲/۱	۱۹۴/۸ ± ۲/۰	۱۹۴/۶ ± ۲/۳	۱۹۵/۸ ± ۲/۳	مدل ۲
·/۳۸	۱۹۶/۶ ± ۲/۹	۱۹۰/۷ ± ۲/۹	۱۹۳/۷ ± ۲/۹	۱۹۶/۹ ± ۲/۹	·/۹۱	۱۹۴/۰ ± ۲/۰	۱۹۳/۸ ± ۲/۹	۱۹۳/۸ ± ۲/۲	۱۹۶/۷ ± ۲/۲	مدل ۳
کلسترول LDL										
·/۳۷	۱۱۵/۰ ± ۲/۵	۱۱۱/۷ ± ۲/۶	۱۱۷/۴ ± ۲/۳	۱۱۷/۱ ± ۲/۵	·/۶۶	۱۱۳/۱ ± ۲/۵	۱۱۴/۴ ± ۲/۸	۱۱۶/۷ ± ۲/۵	۱۱۷/۱ ± ۲/۵	خام
·/۷۲	۱۱۳/۱ ± ۲/۵	۱۱۳/۱ ± ۲/۵	۱۱۶/۴ ± ۲/۵	۱۱۴/۹ ± ۲/۵	·/۶۱	۱۱۷/۴ ± ۲/۵	۱۱۵/۴ ± ۲/۵	۱۱۲/۴ ± ۲/۸	۱۱۶/۳ ± ۲/۸	مدل ۱
·/۷۷	۱۱۵/۹ ± ۲/۶	۱۱۳/۴ ± ۲/۵	۱۱۷/۰ ± ۲/۵	۱۱۵/۶ ± ۲/۶	·/۶۶	۱۱۷/۵ ± ۲/۷	۱۱۵/۵ ± ۲/۶	۱۱۲/۵ ± ۲/۸	۱۱۶/۵ ± ۲/۸	مدل ۲
·/۷۶	۱۱۷/۲ ± ۲/۶	۱۱۳/۴ ± ۲/۵	۱۱۵/۹ ± ۲/۵	۱۱۵/۳ ± ۲/۵	·/۴۵	۱۱۷/۹ ± ۲/۶	۱۱۴/۷ ± ۲/۶	۱۱۲/۰ ± ۲/۸	۱۱۷/۳ ± ۲/۸	مدل ۳

جدول ۳: عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در چارک‌های دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه^{*} (ادامه)

[†] P	چارک‌های روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه ^{***}				P	چارک‌های روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه ^{**}				کاسترول HDL
	Q _r	Q _t	Q _r	Q _t		Q _r	Q _t	Q _r	Q _t	
.0/.37	46/7 ± .6	45/1 ± .7	46/3 ± .7	46/2 ± .7	.0/.9	46/8 ± .6	45/2 ± .7	46/9 ± .6	45/2 ± .7	خام
.0/.48	46/8 ± .7	45/3 ± .6	46/1 ± .6	46/0 ± .7	.0/.48	46/7 ± .6	45/7 ± .6	46/8 ± .7	45/3 ± .7	مدل ۱
.0/.68	46/5 ± .7	45/4 ± .6	46/1 ± .7	46/1 ± .7	.0/.60	46/3 ± .7	45/7 ± .7	46/7 ± .7	45/4 ± .7	مدل ۲
.0/.70	46/4 ± .7	45/3 ± .6	46/2 ± .7	46/2 ± .7	.0/.56	46/3 ± .7	45/8 ± .7	46/8 ± .7	45/3 ± .7	مدل ۳
آپو A										
.0/.07	156/3 ± 2/5	155/5 ± 2/6	148/9 ± 2/0	156/7 ± 9/2	.0/.17	157/1 ± 2/5	156/1 ± 2/7	150/2 ± 2/0	152/9 ± 2/2	خام
.0/.06	157/0 ± 2/4	155/7 ± 2/4	148/8 ± 2/4	155/8 ± 2/4	.0/.87	152/7 ± 2/4	154/9 ± 2/4	155/6 ± 2/6	154/2 ± 2/6	مدل ۱
.0/.18	155/6 ± 2/4	155/9 ± 2/4	149/9 ± 2/4	156/8 ± 2/4	.0/.89	153/0 ± 2/5	154/8 ± 2/4	156/0 ± 2/7	154/3 ± 2/7	مدل ۲
.0/.15	155/8 ± 2/5	155/9 ± 2/4	149/7 ± 2/4	156/7 ± 2/4	.0/.92	153/2 ± 2/5	154/7 ± 2/4	155/8 ± 2/7	154/6 ± 2/7	مدل ۳
آپو B										
<0/.05	114/2 ± 1/9	116/3 ± 2/3	111/1 ± 2/0	120/8 ± 2/1	.0/.21	114/2 ± 2/0	115/1 ± 1/9	112/7 ± 2/4	119/4 ± 2/1	خام
.0/.12	116/6 ± 2/1	117/5 ± 2/0	114/1 ± 2/0	118/3 ± 2/1	.0/.68	113/8 ± 2/1	117/3 ± 2/0	116/1 ± 2/3	115/0 ± 2/3	مدل ۱
.0/.25	117/7 ± 2/1	118/4 ± 2/1	117/8 ± 2/1	119/0 ± 2/1	.0/.66	113/5 ± 2/2	117/0 ± 2/1	116/9 ± 2/3	115/5 ± 2/3	مدل ۲
.0/.19	116/9 ± 2/1	117/5 ± 2/0	118/7 ± 2/0	118/7 ± 2/0	.0/.84	113/9 ± 2/1	116/3 ± 2/0	116/4 ± 2/3	115/7 ± 2/3	مدل ۳

^{*}داده‌ها شامل میانگین ± خطای استاندارد هستند^{**}روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه شامل روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کانولا^{***}روغن‌های گیاهی هیدروژنه (به طور معمول برای پخت و پز در ایران استفاده می‌شود) و مارگارین

† گرفته شده از آزمون ANCOVA

مدل ۱: تعدیل برای سن، جنس و کل انرژی دریافتی انجام شده است

مدل ۲: تعدیل‌های بیشتر برای استعمال دخانیات، فعالیت فیزیکی، دریافت‌های غذایی گوشت، غلات، میوه‌های و سبزیجات، لبیات، روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیرهیدروژنه

مدل ۳: کنترل بیشتر برای شاخص توده بدنی

LDL: Low density lipoprotein; HDL: High density lipoprotein

انجام شد (۲۹)، جایگزینی اسیدهای چرب ترانس با اسیدهای چرب اشباع، تک غیر اشباع و یا چند غیر اشباع، نسبت سطوح سرمی کلسترول تام به HDL-C را کاهش داد. گزارش شده است که جایگزینی روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه با روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه، سبب کاهش بروز بیماری‌های قلبی-عروقی می‌شود (۱۶). حتی در زنان ایرانی، نشان داده شده است که دریافت بالای روغن‌های هیدروژنه به طور معنی‌داری با عوامل خطر بیماری‌های قلبی-عروقی در ارتباط است؛ در حالی که مصرف روغن‌های غیر هیدروژنه ارتباط معکوسی با عوامل خطر قلبی-عروقی داشت (۳۰). چنین یافته‌هایی توسط دیگر محققین نیز تأیید شده است (۳۱، ۳۲).

مغایرت بین یافته‌های مطالعه حاضر با یافته‌های دیگران، می‌تواند به علت تفاوت در جامعه مورد بررسی، نوع دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و خطاهای تصادفی باشد (۲۷). علت دیگر می‌تواند مرتبط با پرسشنامه بسامد خوارکی استفاده شده در مطالعه باشد. در مطالعه اخیر، ما یک پرسشنامه بسامد خوارک ۴۹ اقلامی استفاده کردیم. چنین پرسشنامه بسامد خوارکی کوتاهی ممکن است در تعیین دریافت‌های روزانه معمول در جمعیت مورد مطالعه ناتوان باشد. اعتبار این پرسشنامه توسط مرکز توسعه علمی پژوهشی تأیید شده بود، ولی ممکن است این کار مطابق با یک مطالعه اعتبارستجو کلاسیک صورت نگرفته باشد. از سوی دیگر، به علت فقدان جدول ترکیب غذایی جامع برای غذاهای ایرانی، ما در ارزیابی دریافت‌های غذایی اسیدهای چرب افراد ناتوان بودیم. این نکته را هم باید در نظر داشت که مصرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه تنها در خانه محاسبه گردید که ممکن است منجر به کم برآورد کردن کل روغن‌های گیاهی شود و بنابراین بر ارتباطات ارزیابی شده تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به شیوه پخت -که می‌تواند بر کیفیت و طبیعت مواد غذی و در نتیجه بر ارتباطات تأثیر بگذارد- در دسترس نبود. اگر چه برای چندین مخدوشگر بالقوه در تحلیل‌ها تعديل انجام شد، اما تأثیر مخدوشگرهای باقی‌مانده را نمی‌توان

دریافت‌های غذایی روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه و سطوح آپولیپوپروتئین‌ها و لیپیدهای سرم آشکار نساخت. برای بررسی ارتباط خطی بین دریافت روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه و متغیرهای متابولیکی، از مدل رگرسیون خطی استفاده شد (جدول ۴). باز هم، در مدل خام ارتباط معکوس معنی‌داری بین روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و سطوح کلسترول و تری‌گلیسرید سرم یافت شد، ولی بعد از تعديل مخدوشگرهای، هیچ ارتباط معنی‌داری بین مصرف روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه یا روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه با متغیرهای متابولیکی دیده نشد.

بحث

در مطالعه مقطعی حاضر، هیچ ارتباط معنی‌داری بین مصرف روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن، چربی‌های سرم و سطوح آپولیپوپروتئین‌ها در بین گروهی از بزرگسالان اصفهانی یافت نشد. مصرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه به طور معکوسی با سطوح کلسترول تام و تری‌گلیسرید سرم در مدل‌های تعديل نشده در ارتباط بود، ولی با تعديل بیشتر برای مخدوشگرهای بالقوه این ارتباط از بین رفت. برای دیگر عوامل خطر قلبی-عروقی و روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه هیچ ارتباطی قبل و بعد از کنترل مخدوشگرهای بالقوه وجود نداشت. نیافتن ارتباط معنی‌دار بین عوامل خطر قلبی-عروقی و روغن‌های گیاهی هیدروژن و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن در مطالعه حاضر در تضاد با نتایج مشابهی رسیدند. Mattson و همکاران (۲۷) هیچ گونه تغییر معنی‌داری در سطوح تری‌گلیسرید یا کلسترول پلاسمای افرادی که روغن‌های هیدروژن مصرف کرده بودند در مقایسه با آن‌هایی که روغن‌های هیدروژن مصرف نکرده بودند، نیافتدند. در یک مطالعه دیگر هم، جایگزینی روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه با روغن‌های گیاهی غیر هیدروژن هیچ تأثیر معنی‌داری بر کلسترول HDL سرم و یا غلظت ApoA نداشت (۲۸). این یافته‌ها با یافته‌های متعدد دیگر همخوانی نداشت Clarke (۱۶، ۲۸، ۲۹). در یک متانالیز که توسط مظفریان و

جدول ۴: ضرایب رگرسیونی ارتباط روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه و روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه با سطوح آپولیپوپروتئین‌ها و چربی‌های سرم

P	روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه ^{**}			روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه ^{***}			قند خون ناشتا (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
	R ²	CI = ۹۵ درصد	β	R ²	CI = ۹۵ درصد	β	
.۰/۲۴	.۰/۰۰	-۲/۱۱۱-۰/۵۴	-۰/۷۸	.۰/۲۶	.۰/۰۰	-۴/۳۱-۰/۰۱	.۰/۰۴
.۰/۸۹	.۰/۰۶	-۱/۲۴-۱/۴۳	.۰/۱۱	.۰/۵۳	.۰/۰۵	-۴/۳۵-۰/۱۲	.۰/۰۲
.۰/۹۶	.۰/۰۶	-۱/۳۱-۱/۳۸	.۰/۰۴	.۰/۳۹	.۰/۰۶	-۴/۱۴-۰/۱۴	.۰/۰۳
.۰/۷۹	.۰/۰۶	-۱/۱۸-۱/۵۴	.۰/۱۸	.۰/۴۱	.۰/۰۷	-۴/۶۸-۰/۱۴	.۰/۰۳
تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)							
< .۰/۰۵	.۰/۰۰	-۱۵/۱۱-۲/۴۳	-۸/۷۲	.۰/۶۰	.۰/۰۰	-۲/۷۴-۰/۶۵	-۰/۰۱
.۰/۱۱	.۰/۰۶	-۱۱/۴۱-۱/۲۶	-۵/۱۰	.۰/۲۲	.۰/۰۷	-۲/۷۲-۰/۵۴	-۰/۰۴
.۰/۱۳	.۰/۰۷	-۱۱/۴۳-۱/۵۲	-۴/۹۷	.۰/۱۷	.۰/۰۷	-۲/۳۲-۰/۹۳	-۰/۰۴
.۰/۳۵	.۰/۱۳	-۹/۳۵-۳/۳۴	-۳/۰۰	.۰/۱۵	.۰/۱۴	-۲/۴۴-۰/۸۰	-۰/۰۵
کلسترول (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)							
< .۰/۰۵	.۰/۰۰	-۵/۹۰-۰/۵۱	-۳/۲۰	.۰/۱۷	.۰/۰۰	-۰/۷۰-۰/۶۴	.۰/۰۴
.۰/۴۹	.۰/۱۱	-۳/۵۴-۱/۷۳	-۰/۹۱	.۰/۹۶	.۰/۱۱	-۰/۷۱-۰/۶۴	-۰/۰۰
.۰/۳۲	.۰/۱۱	-۴/۰۹-۱/۳۴	-۱/۳۷	.۰/۶۱	.۰/۱۱	-۰/۷۱-۰/۷۱	-۰/۰۲
.۰/۷۴	.۰/۱۸	-۳/۰۸-۲/۱۹	-۰/۰۴۴	.۰/۵۷	.۰/۱۳	-۰/۷۳-۰/۶۵	-۰/۰۲
کلسترول LDL (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)							
.۰/۳۰	.۰/۰۰	-۳/۴۶-۱/۰۵	-۱/۲۱	.۰/۰۷	.۰/۰۰	-۰/۳۱-۰/۹۱	.۰/۰۶
.۰/۸۴	.۰/۶۶	-۱/۹۹-۲/۴۵	.۰/۲۲	.۰/۵۰	.۰/۰۶	-۰/۲۹-۰/۹۲	.۰/۰۲
.۰/۸۰	.۰/۰۷	-۲/۶۲-۲/۰۲	-۰/۰۲۹	.۰/۵۹	.۰/۰۷	-۰/۲۵-۰/۹۴	.۰/۰۲
.۰/۷۸	.۰/۱۱	-۱/۹۷-۲/۶۱	.۰/۳۲	.۰/۶۵	.۰/۱۱	-۰/۲۴-۰/۹۳	.۰/۰۲
کلسترول HDL (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)							
.۰/۹۱	.۰/۰۰	-۰/۵۵-۰/۶۲	.۰/۰۳	.۰/۱۴	.۰/۰۰	-۰/۱۹-۰/۱۰	.۰/۰۵
.۰/۶۱	.۰/۰۲	-۰/۴۳-۰/۷۴	.۰/۱۵	.۰/۵۹	.۰/۰۴	-۰/۲۲-۰/۱۲	.۰/۰۲
.۰/۹۲	.۰/۰۴	-۰/۵۷-۰/۶۳	.۰/۰۳	.۰/۶۱	.۰/۰۴	-۰/۲۱-۰/۱۲	.۰/۰۲
.۰/۸۹	.۰/۰۴	-۰/۶۵-۰/۵۷	-۰/۰۴	.۰/۵۹	.۰/۰۵	-۰/۲۱-۰/۱۲	.۰/۰۲
آپو A							
.۰/۶۱	.۰/۰۰	-۱/۵۲-۲/۶۳	.۰/۵۴	.۰/۹۹	.۰/۰۰	-۱/۰۱-۰/۱۴	-۰/۰۰۲
.۰/۳۲	.۰/۰۲۱	-۱/۰۴-۳/۱۷	.۱/۰۷	.۰/۵۸	.۰/۰۲	-۱/۰۱-۰/۱۱	-۰/۰۰۲
.۰/۷۹	.۰/۰۲	-۱/۸۹-۲/۴۷	.۰/۲۹	.۰/۶۴	.۰/۰۳	-۱/۱۱-۰/۰۳	-۰/۰۲
.۰/۷۸	.۰/۰۲	-۱/۸۹-۲/۵۰	.۰/۳۱	.۰/۶۳	.۰/۰۳	-۱/۱۴-۰/۰۲	-۰/۰۲
آپو B							
.۰/۱۲	.۰/۰۰	-۳/۳۳-۰/۳۷	-۱/۴۸	.۰/۵۹	.۰/۰۰	-۰/۵۹-۰/۳۱	.۰/۰۲
.۰/۷۲	.۰/۰۵	-۲/۱۶-۱/۵۰	-۰/۳۳	.۰/۷۵	.۰/۰۵	-۰/۶۲-۰/۳۱	-۰/۰۱
.۰/۳۳	.۰/۰۶	-۲/۸۵-۰/۹۶	-۰/۰۹۴	.۰/۵۵	.۰/۰۶	-۰/۶۱-۰/۳۳	-۰/۰۲
.۰/۷۳	.۰/۱۱	-۲/۱۹-۱/۵۵	-۰/۰۳۲	.۰/۵۶	.۰/۱۱	-۰/۶۲-۰/۳۳	-۰/۰۲

* روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه شامل: روغن‌های سویا، آفتابگردان، ذرت، زیتون و کاتولا

** روغن‌های گیاهی هیدروژنه (به طور معمول برای پخت و پز در ایران استفاده می‌شود) و مارگارین

مدل ۱: سن، جنس و انرژی دریافتی کل تعیین شده است

مدل ۲: تغذیه‌ای بیشتر برای استعمال دخانیات، فعالیت فیزیکی، دریافت‌های غذایی گوشت، غلات، میوه‌ها و سبزیجات، لبنيات، روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه

مدل ۳: تعديل اضافی برای شاخص توده بدنی

LDL: Low density lipoprotein; HDL: High density lipoprotein

نیمه هیدروژنه یا روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه باید در مطالعات آینده‌نگر تأیید شود. در نتیجه، هیچ ارتباط معنی‌داری بین مصرف روغن‌های گیاهی نیمه هیدروژنه و روغن‌های گیاهی غیر هیدروژنه و خطر قلبی-عروقی در این جمعیت یافت نشد.

نادیده گرفت. طراحی مقطعی مطالعه اخیر نیز می‌تواند در توضیح مغایرت در یافته‌ها کمک کند. فقدان ارتباط معنی‌دار در مطالعه اخیر نیازمند تحقیقات بیشتر است. بنابراین ارتباط بین عوامل خطر قلبی-عروقی و مصرف روغن‌های گیاهی

References

- Okrainec K, Banerjee DK, Eisenberg MJ. Coronary artery disease in the developing world. *Am Heart J* 2004; 148(1): 7-15.
- Yusuf S, Reddy S, Ounpuu S, Anand S. Global burden of cardiovascular diseases: Part II: variations in cardiovascular disease by specific ethnic groups and geographic regions and prevention strategies. *Circulation* 2001; 104(23): 2855-64.
- Reaven P. Metabolic syndrome. *J Insur Med* 2004; 36(2): 132-42.
- Navab M, Reddy ST, Van Lenten BJ, Anantharamaiah GM, Fogelman AM. The role of dysfunctional HDL in atherosclerosis. *J Lipid Res* 2009; 50(Suppl): S145-S149.
- Walldius G, Jungner I. The apoB/apoA-I ratio: a strong, new risk factor for cardiovascular disease and a target for lipid-lowering therapy--a review of the evidence. *J Intern Med* 2006; 259(5): 493-519.
- Mudd JO, Borlaug BA, Johnston PV, Kral BG, Rouf R, Blumenthal RS, et al. Beyond low-density lipoprotein cholesterol: defining the role of low-density lipoprotein heterogeneity in coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50(18): 1735-41.
- Barter PJ, Ballantyne CM, Carmena R, Castro CM, Chapman MJ, Couture P, et al. Apo B versus cholesterol in estimating cardiovascular risk and in guiding therapy: report of the thirty-person/ten-country panel. *J Intern Med* 2006; 259(3): 247-58.
- Sniderman AD, Furberg CD, Keech A, Roeters van Lennep JE, Frohlich J, Jungner I, et al. Apolipoproteins versus lipids as indices of coronary risk and as targets for statin treatment. *Lancet* 2003; 361(9359): 777-80.
- Sniderman AD, Scantlebury T, Cianflone K. Hypertriglyceridemic hyperapoB: the unappreciated atherogenic dyslipoproteinemia in type 2 diabetes mellitus. *Ann Intern Med* 2001; 135(6): 447-59.
- Williams K, Sniderman AD, Sattar N, D'Agostino R, Wagenknecht LE, Haffner SM. Comparison of the associations of apolipoprotein B and low-density lipoprotein cholesterol with other cardiovascular risk factors in the Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS). *Circulation* 2003; 108(19): 2312-6.
- Aldana SG, Whitmer WR, Greenlaw R, Avins AL, Salberg A, Barnhurst M, et al. Cardiovascular risk reductions associated with aggressive lifestyle modification and cardiac rehabilitation. *Heart Lung* 2003; 32(6): 374-82.
- Koertge J, Weidner G, Elliott-Eller M, Scherwitz L, Merritt-Worden TA, Marlin R, et al. Improvement in medical risk factors and quality of life in women and men with coronary artery disease in the Multicenter Lifestyle Demonstration Project. *Am J Cardiol* 2003; 91(11): 1316-22.
- Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials. *Am J Clin Nutr* 2003; 77(5): 1146-55.
- Judd JT, Baer DJ, Clevidence BA, Kris-Etherton P, Muesing RA, Iwane M. Dietary cis and trans monounsaturated and saturated FA and plasma lipids and lipoproteins in men. *Lipids* 2002; 37(2): 123-31.
- Oomen CM, Ocke MC, Feskens EJ, van Erp-Baart MA, Kok FJ, Kromhout D. Association between trans fatty acid intake and 10-year risk of coronary heart disease in the Zutphen Elderly Study: a prospective population-based study. *Lancet* 2001; 357(9258): 746-51.
- Mozaffarian D, Abdollahi M, Campos H, Houshiarrad A, Willett WC. Consumption of trans fats and estimated effects on coronary heart disease in Iran. *Eur J Clin Nutr* 2007; 61(8): 1004-10.
- Fazizi F, Esmaillzadeh A, Mirmiran FP. Obesity and cardiovascular disease risk factors in Tehran adults: a population-based study. *East Mediterr Health J* 2004; 10(6): 887-97.
- Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Home use of vegetable oils, markers of systemic inflammation, and endothelial dysfunction among women. *Am J Clin Nutr* 2008; 88(4): 913-21.
- Azadbakht L, Mirmiran P, Esmaillzadeh A, Azizi F. Dairy consumption is inversely associated with the prevalence of the metabolic syndrome in Iranian adults. *Am J Clin Nutr* 2005; 82(3): 523-30.

20. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Consumption of hydrogenated versus nonhydrogenated vegetable oils and risk of insulin resistance and the metabolic syndrome among Iranian adult women. *Diabetes Care* 2008; 31(2): 223-6.
21. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Food intake patterns may explain the high prevalence of cardiovascular risk factors among Iranian women. *J Nutr* 2008; 138(8): 1469-75.
22. Solhpour A, Parkhideh S, Sarrafzadegan N, Asgary S, Williams K, Jungner I, et al. Levels of lipids and apolipoproteins in three cultures. *Atherosclerosis* 2009; 207(1): 200-7.
23. Sarraf-Zadegan N, Sadri G, Malek AH, Baghaei M, Mohammadi FN, Shahrokhi S, et al. Isfahan Healthy Heart Programme: a comprehensive integrated community-based programme for cardiovascular disease prevention and control. Design, methods and initial experience. *Acta Cardiol* 2003; 58(4): 309-20.
24. Sarrafzadegan N, Baghaei AM, Sadri GH, Kelishadi R, Malekafzali H, Boshtam M, et al. Isfahan Healthy Heart Program: Evaluation of comprehensive, community-based interventions for non-communicable disease. *Prevention and Control J* 2006; 2(2): 73-84.
25. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. *Clin Chem* 1972; 18(6): 499-502.
26. Pereira MA, FitzerGerald SJ, Gregg EW, Joswiak ML, Ryan WJ, Suminski RR, et al. A collection of Physical Activity Questionnaires for health-related research. *Med Sci Sports Exerc* 1997; 29(6 Suppl): S1-205.
27. Mattson FH, Hollenbach EJ, Kligman AM. Effect of hydrogenated fat on the plasma cholesterol and triglyceride levels of man. *Am J Clin Nutr* 1975; 28(7): 726-31.
28. Vega-Lopez S, Matthan NR, Ausman LM, Ai M, Otokozawa S, Schaefer EJ, et al. Substitution of vegetable oil for a partially-hydrogenated fat favorably alters cardiovascular disease risk factors in moderately hypercholesterolemic postmenopausal women. *Atherosclerosis* 2009; 207(1): 208-12.
29. Mozaffarian D, Clarke R. Quantitative effects on cardiovascular risk factors and coronary heart disease risk of replacing partially hydrogenated vegetable oils with other fats and oils. *Eur J Clin Nutr* 2009; 63(Suppl 2): S22-S33.
30. Esmaillzadeh A, Azadbakht L. Different kinds of vegetable oils in relation to individual cardiovascular risk factors among Iranian women. *Br J Nutr* 2011; 105(6): 919-27.
31. Teegala SM, Willett WC, Mozaffarian D. Consumption and health effects of trans fatty acids: a review. *J AOAC Int* 2009; 92(5): 1250-7.
32. Micha R, Mozaffarian D. Trans fatty acids: effects on cardiometabolic health and implications for policy. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids* 2008; 79(3-5): 147-52.

Dietary Intake of Vegetable Oils, Serum Lipids and Apolipoprotein Levels among Iranians

Parisa Hajhashemi¹, Parvaneh Sanei¹, Hossein Khosravi Broujeni², Nizal Sarrafzadegan³, Noushin Mohammadifard⁴, Firoozeh Sajadi⁴, Sedigheh Asgari⁵, Maryam Maghroun⁴, Hasan Alikhasi⁴, Ahmad Esmaellzadeh⁶

Original Article

Abstract

Background: The detrimental effects of partially hydrogenated vegetable oils (PHVOs) on apolipoproteins have been reported from several parts of the world; however, few data are available in this regard from the understudied region of the Middle East. The present study aimed to evaluate the association between type of vegetable oils, serum lipids and apolipoprotein levels among Iranians.

Methods: In this cross-sectional study, data of 1772 people (795 men and 977 women) aged 19 to 81 years were used. Participants were selected through multistage cluster random sampling method from three counties of Isfahan, Najafabad and Arak, Iran in Isfahan Healthy Heart Program (IHHP). To assess participants' usual dietary intakes, a validated food frequency questionnaire was used. Consumption of hydrogenated vegetable oil (commonly consumed for cooking in Iran) and margarine was considered as the category of PHVOs. Consumption of soy, sunflower, corn, olive and canola oils was considered as non-HVOs category. After an overnight fasting, serum cholesterol (total, LDL, and HDL) and triglyceride as well as apolipoproteins A and B were measured using standard methods.

Findings: Participants with the highest intake of non-HVOs and PHVOs were younger and had lower weight than those with the lowest intake. High consumption of non-HVOs and PHVOs was associated with lower intake of energy, carbohydrate, dietary fiber, and higher intake of fruits, vegetables, meat, milk and grains. No overall significant differences were found in serum lipids and apolipoprotein levels across quartiles of non-HVOs as well as PHVOs after controlling for potential confounding.

Conclusion: There was no significant association between hydrogenated or non-hydrogenated vegetable oil and serum lipid and apolipoprotein levels. Further studies are needed to explore this association.

Key words: Vegetable Oils, Cardiovascular Risk Factors, Lipids, Apolipoproteins, Diet

Citation: Hajhashemi P, Sanei P, Khosravi Broujeni H, Sarrafzadegan N, Mohammadifard N, Sajadi F, et al. **Dietary Intake of Vegetable Oils, Serum Lipids and Apolipoprotein Levels among Iranians.** J Health Syst Res 2013; 8(6): 959-71.

Received date: 02/09/2012

Accept date: 05/11/2012

1-MSc Student, Student Research Committee, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Flavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3- Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- Department of Nutrition, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5- Professor, Department of Basic Sciences, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

6- Associate Professor, Food Security Research Center, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran (Corresponding Author) Email: esmailzadeh@hlth.mui.ac.ir